

みょうが(花穂)			みょうが(花穂)の収穫14日前まで みょうが(花穂)の収穫14日前まで但し花穂を収穫しない場合 にあつては開花期終了まで	4回以内	
みょうが(茎葉)	葉枯病、紋枯病				
らっかせい	褐斑病	500倍	収穫14日前まで	本剤:3回以内 TPN:4回以内 (土壌灌注は1回以内、散布は3回以内)	
ねぎ	黒斑病、べと病、小菌核腐敗病、葉枯病、さび病	1,000倍			
わけぎ			3回以内		
らっきょう	灰色かび病	1,000倍	収穫7日前まで	6回以内	
たまねぎ	べと病、灰色かび病、白色疫病		収穫7日前まで	6回以内	
にんにく	葉枯病、黄斑病、白斑葉枯病、さび病			6回以内	
にんじん	黒葉枯病	500~1,000倍	収穫7日前まで	本剤:5回以内 TPN:5回以内 (種子への吹き付け処理1回以内)	
ばれいしょ	疫病 夏疫病			5回以内	
うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)	炭疽病、うどんこ病、べと病、つる枯病	1,000倍	収穫前日まで	4回以内	散布
にがうり	炭疽病、うどんこ病、べと病、斑点病、つる枯病				
ゆうがお	炭疽病、うどんこ病、べと病		5回以内		
かぼちゃ	べと病、白斑病、うどんこ病		収穫7日前まで	3回以内	
ズッキーニ	うどんこ病				
ごぼう				収穫前日まで	