

適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びアセフェートを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用方法									
花き類・観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類	1,000～1,500倍	100～300ml/m ²	発生初期	5回以内	散布									
	アオムシ、ヨトウムシ類	1,000倍													
きく	マメハモグリバエ、オオタバコガ														
ストック	コナガ、ハイマダラノメイガ														
宿根アスター	ヨメナスジハモグリバエ														
カーネーション	コナガ														
ひまわり	タバコガ														
斑入りアマドコロ、リアトリス	ハマキムシ類														
オンシジウム	カイガラムシ類														
グラジオラス	アザミウマ類						-	植付時	本剤:1回 アセフェート:5回以内	10分間球根浸漬					
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ、タマナヤガ、ケラ	1,000倍	1～2L/m ²	発生初期	5回以内	散布									
	シバオサゾウムシ成虫		2L/m ²												
	アカフツヅリガ		0.5～1L/m ²												
さくら	アザミウマ類	1,500～2,000倍	200～				発生初期	5回以内	散布						
	アメリカシロヒトリ														
	モンクロシャチホコ														
つつじ類	ツツジゲンバイ	1,500倍	700ml/m ²							発生初期	5回以内	散布			
	アザミウマ類	1,000倍													
つばき類	アザミウマ類	1,000倍													