

			り直後、及び病枝切除後	チオファネートメチル：11回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内）
	胴枯病、輪紋病、黒斑病、 紅粒がんしゅ病、腐らん病		剪定整枝時及び病患部削り取り直後	
かき	切り口及び傷口のゆ合促進		剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：10回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内）
	切り口の枯込防止		剪定整枝時	
マルメロ かりん			剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：9回以内（塗布は3回以内、散布は6回以内）
いちじく	切り口及び傷口のゆ合促進		剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：14回以内（塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内）
かんきつ	幹腐病 切り口の枯込防止		剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：8回以内（塗布は3回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計5回以内）
			剪定整枝時	
キウイフルーツ			剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：8回以内（塗布は3回以内、散布は5回以内）
おうとう	切り口及び傷口のゆ合促進		剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：6回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内）
びわ			剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：7回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内）
ぶどう	晩腐病 つる割病	3倍	休眠期（萌芽前）	本剤：3回以内 チオファネートメチル：5回以内（塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内）
	切り口及び傷口のゆ合促進		剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	
くり	胴枯病	原液	病患部削り取り直後	本剤：3回以内 チオファネートメチル：7回以内（散布は4回以内、塗布は3回以内）
さくら	てんぐ巣病		病枝切除後	5回以内