

# 適用害虫と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期※	総使用回数※
トマト	オンシツコナジラミ、アブラムシ類	300～450 倍	100～300 ml/m <sup>2</sup>	収穫前日	3 回以内
ミニトマト		450 倍			1 回
きゅうり	オンシツコナジラミ、アブラムシ類、ウリハムシ	300～450 倍			3 回以内
ズッキーニ	アブラムシ類、フキノメイガ			収穫 7 日前	本剤: 3 回以内。 ヘルメリン: 6 回以内(乳剤は 3 回以内、粒剤は 3 回以内)
すいか、メロン、かぼちゃ	アブラムシ類			5 回以内	
なす	アブラムシ類			収穫前日	3 回以内
	オンシツコナジラミ、テントウムシダマシ類、カメムシ類	300 倍			
ピーマン	アブラムシ類	300～450 倍		5 回以内	
	タバコガ、カメムシ類	300 倍			
とうがらし類	アブラムシ類	300～450 倍		収穫 7 日前	2 回以内
	タバコガ	300 倍			
ばれいしょ	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	300～450 倍	収穫 14 日前	4 回以内	
やまのいも	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、アサミウマ類		収穫 7 日前	5 回以内	