

# 適用病害と使用方法

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※			
				本剤	ベンチアハリカルブイソプロピル	TPN	
トマト	葉かび病	1000 倍	収穫前日まで	3 回以内	3 回以内	6 回以内(土壌灌注は 2 回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 4 回以内)	
	疫病	1000～ 1500 倍					
ミニトマト		1500 倍		2 回以内		2 回以内	
きゅうり	べと病	1000～ 1500 倍		3 回以内		10 回以内(土壌灌注は 2 回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 8 回以内)	
	褐斑病、うどんこ病、黒星病						
なす	褐色腐敗病、 すすかび病			4 回以内		4 回以内	4 回以内
たまねぎ	べと病、 白色疫病、 灰色かび病	1000 倍		収穫 7 日前まで		3 回以内	6 回以内
ねぎ	べと病、葉枯病			収穫 14 日前まで			4 回以内(土壌灌注は 1 回以内、散布は 3 回以内)
らっきょう	白色疫病						3 回以内
アスパラガス		1500 倍		収穫前日まで			4 回以内
ばれいしょ	疫病	750 ～ 1000 倍	収穫 7 日前まで	5 回以内	5 回以内		