

●ガーデンパワーバラ用 850ml

* 印は、収穫物への残留農薬基準値を確保するため、その日まで使用できる収穫（摘採）前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	使用時期*	総使用回数*			
			本剤のみ	エマメクチン 安息香酸塩	チアメトキサム	ジフェノコナゾール
トマト	アブラムシ類 葉かび病	収穫前日	3回	5回	4回（定植時までの 処理は1回、散布 は3回）	3回
なす	アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類 テントウムシダマシ類		2回	2回		
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 うどんこ病					
キャベツ	アオムシ ハスモンヨトウ	収穫 14 日前	3回	3回	4回（定植時までの 処理は1回、定植 後の散布は3回）	3回
いちご	アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病	収穫前日	2回	2回	4回（定植時の植 穴処理は2回、散 布は2回）	
花き類・観葉植物 (ばら、きくを除く)	アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病	発生前～ 初期 発生初期	5回	5回	6回	
ばら	アブラムシ類	発生前～ 初期				
	ハダニ類 チュウレンジハバチ うどんこ病 黒星病	発生初期				
	クロケシツブチョッキリ コガネムシ類					
きく	アブラムシ類	発生前～ 初期				
	ハダニ類 うどんこ病 白さび病 褐斑病 黒斑病	発生初期				
	アブラムシ類		発生前～			
パンジー	アブラムシ類	発生前～				

		初期		
	ハスモンヨトウ	発生初期		
	ハダニ類			
	うどんこ病			
つばき類 (やぶつばきを除く)	チャドクガ			
やぶつばき	ツノロウムシ ツバキワタカイガラムシ チャドクガ		6回	5回
つつじ類	ツツジグンバイ			