

●カダン MAX1000ml

※印は使用できる収穫（摘採）前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	使用 時期※	総使用回数※			
			本剤の み	フルベンジアミド	フロニカミド	ピラジフルミド
きゅうり	アブラムシ類 うどんこ病 褐斑病	収穫 前日	3 回	3 回	3 回	3 回
トマト ミニトマト	アブラムシ類 オオタバコガ コナジラミ類		2 回	2 回		
なす	アブラムシ類 うどんこ病		3 回	3 回		
ピーマン	アブラムシ類 オオタバコガ		2 回	2 回	2 回	3 回（灌注は 1 回）
はくさい	アオムシ			4 回（灌注は 1 回、散布及び 無人航空機散 布は合計 3 回）		
キャベツ	アオムシ コナガ ウワバ類			3 回（灌注は 1 回、散布及び 無人航空機散 布は合計 2 回）		
ブロッコリー	ハマダラメカイ ハスモントウ			2 回		
レタス	アブラムシ類 ハスモンヨトウ			2 回		
非結球レタス	アブラムシ類 ハスモンヨトウ		2 回			
ねぎ	さび病	収穫 7 日前	3 回	3 回	3 回（灌注及び浸漬は合計 1 回）	
えだめ	アブラムシ類	収穫前日	2 回	2 回	3 回	
さやえんどう	アブラムシ類					2 回
あずき	アブラムシ類					3 回
にがうり	アブラムシ類	収穫 前日		2 回		2 回
メロン	アブラムシ類 コナジラミ類					
すいか	アブラムシ類					
いちご	うどんこ病					
かんきつ（みか んを除く）	ケムシ類 アゲハ類	収穫 14 日前			3 回	2 回
みかん	ケムシ類 アゲハ類	収穫 7 日前			2 回	

りんご	アブラムシ類 黒星病	収穫 14 日前				
なし	ケムシ類					
ぶどう	ケムシ類	開花前		3 回（樹幹散 布は 1 回、散 布は 2 回）		
すもも	ケムシ類	収穫 7 日前				
花き類・ 観葉植物	アブラムシ類 ハスモンヨトウ コナジラミ類 （パンジー） ミカンイロアザミウマ （ばら）	発生前～ 発生初期	3 回	4 回	6 回	3 回
	うどんこ病（ばら） 黒星病（ばら）	発病初期				
樹木類	ケムシ類	発生前～ 発生初期	6 回	6 回	6 回	6 回